

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 05 du 18 mai 2004 - 02 pages

Phénologie

Les stades s'échelonnent de la levée jusqu'au stade 10-15 cm pour les parcelles les plus avancées.

Mildiou

Situation sanitaire

Nos tournées de prospection se poursuivent. Des tas de déchets sont toujours présents.

Il est toujours urgent de bâcher les tas de déchets qui ne le sont pas encore.

La présence de repousses des pommes de terre est toujours importante dans les parcelles de betteraves. Elles peuvent être à l'origine de foyers primaires. Certains désherbants sur cultures de betteraves freinent la croissance de ces repousses mais seulement pour un temps limité.

Il convient d'OBSERVER leur feuillage.

Le coin des modèles

Etant donné les conditions sèches de ces derniers jours, aucune nouvelle génération n'est enregistrée depuis le dernier bulletin.

Date de renouvellement des traitements

L'objectif est d'éviter les traitements systématiques à 7 jours lorsqu'ils sont inutiles, et de limiter les intrants en réalisant les interventions «au meilleur moment seulement quand c'est utile».

Notre modèle Guntz-Divoux nous permet de positionner au mieux le premier traitement (voir bulletin précédent).

Notre modèle MILSOL nous apporte des informations sur le potentiel de sporulation. Nous vous les communiquerons dorénavant dans le tableau de situation épidémiologique poste/poste dans la colonne «potentiel de sporulation».

Ce potentiel (nul, faible, moyen ou fort) vous servira à raisonner le renouvellement de vos traitements fongicides.

Lorsque le potentiel de sporulation est nul (absence de tache active), les conditions climatiques favorables ne permettent pas une production significative d'inoculum.

Le renouvellement des traitements peut être décalé même en variétés sensibles lorsque l'environnement de la parcelle est sain

Mildiou:
Taches
sporulantes sur
tas de déchets:
Détruisez les !

**Intervention ou
renouvellement
sur variétés
sensibles dans
environnement
contaminé.**

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens	2 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Attilly	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	moyen
Ebouleau	4 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Forte	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	moyen
Froidmont	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Inval	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Marcelcave	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Saint Just en Chaussée	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Vauvillers	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Verdilly	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Vic sur Aisne	2 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Villerooy	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Villers Bocage	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort
Villiers le Sec	3 ^{ème}	du 18 au 22 mai	fort

Ministère
de l'Agriculture
Service Régional de la
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-
picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-
picardie.com

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Picardie par
délégation (art. L252-1 à
L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 59 €
Tarif Fax 59€
Tarif E-mail 57 €

sur variétés sensibles

En fonction des secteurs, le potentiel de sporulation est moyen à fort. Sur les variétés sensibles, le renouvellement est nécessaire.

➤ sur variétés intermédiaires et résistantes

1-Parcelles levées à plus de 50%, situées dans les secteurs avec tas de déchets et présence de symptômes de mildiou sporulants :

-Si vous n'êtes pas encore intervenu, appliquez dès maintenant votre premier fongicide.

Etant donnée la présence de nombreux tas de déchets et de repousses, l'intervention fongicide devra être réalisée avant l'arrivée des prochaines pluies. Météo France ne prévoit pas de pluie avant le début de la semaine prochaine.